



Wolters Kluwer

When you have to be right

UpToDate®
クイックリファレンス
カード

エビデンスに基づいた臨床意思
決定支援ツールを利用して、
臨床上の疑問をその場で解決

www.uptodate.com
www.wolterskluwer.com

UpToDate®で臨床上の疑問に対する回答を入手

1

日本語や英語で
検索語句を入力
具体的に入力すると、
調べたい情報に近い
結果が得られ易くなります。

1文字以上の入力で、オートコンプリート
機能が検索候補を表示



ユーザー名、パスワード、アカウント 情報を変更

CME/CE/CPD単位が追加
費用なしで取得可能

「Practice Changing
Updates」(診療変更に関する
最新アップデート)を確認

専門領域ごとの「What's
New」(最新情報)を表示

検索結果をフィルタリングで
絞り込むことも可能

臨床トピックにマウスのポインターを
重ねると概要を表示。リンクをクリック
して、見たいセクションに移動

患者に見せたり渡したりする
患者向けトピックを入手

各専門領域の臨床
トピック一覧を確認

2

「検索結果」を確認

検索結果には、臨床上の疑問解決
に結びつく臨床トピック、セクション、
画像が表示されます。



薬物相互作用データベース
へアクセス (Lexicomp®と
提携)

様々な医療測定値を計算

検索結果や臨床トピックの
概要を表示・非表示にして
画面表示をカスタマイズ

表示された検索結果を更に絞り込む / 例えば「画像」を選択
すると画像のみを表示

3

臨床トピックの内容を確認

エビデンスに基づいた10,500件を超える臨床トピックが、最適な患者ケアに必要な情報を提供します。

執筆者・編集者に関する情報へのリンク

臨床トピックの最終更新日を**確認**
(トピックの内容は最新研究を継続的に検討して更新)

多言語で**検索可能**

CME/CE/CPD単位が追加費用なしで**取得可能**

臨床トピックを同僚や患者に**Eメールで共有**

本文、参考文献、画像、臨床トピック全文を**印刷**

患者に見せたり渡したりする患者向け教育記事を**入手**

「Find」(検索)機能を使って臨床トピック中の語句や同義語を検索

クリックしてMedlineの抄録(可能な場合はフルテキスト)を表示

質問や意見を編集部へ**送信**

ここから下に臨床トピックの概要項目を表示

クリックして要約や推奨治療法に移動

各項目をクリックして必要な情報に移動

臨床トピックに関連する全ての画像をサムネイル(縮小表示)形式で表示

格付け済みエビデンスと推奨治療法

関連する臨床トピックにアクセスして詳細情報を確認

「Find」(検索)機能を使って臨床トピック中の語句や同義語を検索

クリックしてMedlineの抄録(可能な場合はフルテキスト)を表示

質問や意見を編集部へ送信

「release of mast cell- derived mediators into immunologic reactions」

「axis of any severity. We recom... with apparently mild symptoms a... wheezing) (Grade 1B) and for p... symptoms and signs (Grade 1A).」

「This topic last updated: Apr 26, 2016.」

「Anaphylaxis is defined as a serious allergic reaction that is rapid in onset and may cause death [6,7]. The diagnosis of anaphylaxis is based primarily upon clinical symptoms and signs, as well as a detailed description of the acute episode, including antecedent activities and events occurring within the preceding minutes to hours.」

「Anaphylaxis is underrecognized and undertreated [8-11]. This may partly be due to failure to appreciate that it can present without obvious skin symptoms and signs and without shock.」

「broader syndrome than "anaphylactic shock," and the goal of therapy should be treatment with epinephrine to prevent progression to life-threatening cardiovascular symptoms and signs, including shock.」

「Diagnostic criteria — Diagnostic criteria for anaphylaxis were initially published by a multidisciplinary group of experts in 2005 and 2006 [6,7]. These criteria were intended to help」

注: この画面は登録ユーザーがUpToDateにアクセスし、CME単位が得られる状況を現しています。

UpToDateは、世界中の学会、協会、機関に認定・認可されており、情報源および学習ツールとして広く受け入れられています。UpToDateの使用がお住まいの国やご自身の専門領域でCME要件として認められるかどうかについては、www.uptodate.com/cmeでCME要件の最新リストをご確認ください。UpToDateの使用がそれぞれの国や専門領域でCME要件として認められるかどうかは、個人の責任で判断してください。

お問い合わせ

エンドユーザー向けカスタマーサポート

個人契約や施設でご利用されているエンドユーザーのサポートは、以下までご連絡ください。

Eメール

utdjapan@wolterskluwer.com

電話：03-5427-1930

ファクシミリ：03-3451-2025

月～金 午前9時～午後6時